

Monitoreo y pronóstico de El Niño


Primera quincena de marzo 2016

Comité Técnico ENFEN

16 de marzo de 2016




ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR POR REGIONES NIÑO EN EL PACÍFICO ECUATORIAL




Regiones Niño	ATSM (Semanales)							
	Niño 1+2		Niño 3		Niño 3.4		Niño 4	
17feb2016	0.5	26.6	1.9	28.3	2.4	29.1	1.4	29.5
24feb2016	0.9	27.1	1.8	28.4	2.1	29.0	1.4	29.5
02mar2016	1.0	27.3	1.8	28.6	1.9	28.9	1.4	29.5
09mar2016	1.2	27.7	1.6	28.6	1.8	28.9	1.5	29.6

Promedios mensuales 2015


Regiones Niño	ATSM							
	Niño 1+2		Niño 3		Niño 3.4		Niño 4	
Feb.2015	0.7	26.8	1.9	28.4	2.4	29.1	1.5	29.6
Ene.2015	1.4	25.9	2.6	28.2	2.6	29.2	1.4	29.7
Dic.2015	2.2	25.0	2.9	28.0	2.8	29.4	1.6	30.1
Nov.2015	2.1	23.7	2.9	27.9	3.0	29.6	1.7	30.3
Oct.2015	2.5	23.3	2.7	27.6	2.5	29.2	1.1	29.8
Set.2015	2.6	22.9	2.6	27.5	2.3	29.0	1.0	29.7
Ago. 2015	2.3	22.9	2.3	27.3	2.1	28.9	1.0	29.7
Jul. 2015	2.9	24.5	2.2	27.8	1.6	28.8	1.0	29.8
Jun. 2015	2.5	25.4	1.7	28.1	1.3	29.0	1.1	29.9
May. 2015	2.4	26.7	1.2	28.3	1.0	28.9	1.1	29.9
Abr. 2015	1.4	27.0	0.7	28.2	0.8	28.6	0.8	29.7
Mar. 2015	0.1	26.7	0.2	27.3	0.6	27.8	1.1	29.3
Feb. 2015	-0.6	25.6	0.2	26.6	0.6	27.3	1.0	29.1




Anomalía de la Temperatura Superficial de Mar






Niño 1+2 daily SST anomaly (°C)



Niño 3.4 daily SST anomaly (°C)




Vientos a 850hPa





Vientos a 200hPa



ANOMALIA DE VIENTO a 200hPa FEBRERO 2016
NCEP-NOAA / SENAMHI -DCL



ANOMALIA DE VIENTO a 200hPa MARZO 2016
NCEP-NOAA / SENAMHI -DCL




VIENTO PROMEDIO a 200hPa MARZO 2016
NCEP-NOAA / SENAMHI -DCL




MONITOREO DE LA CIRCULACION ATMOSF. EC. 5°N-5°S


a)




b)







c)




c)





Índice de Oscilación del Sur




FUENTE: BUREAU OF METEOROLOGY

(rango de valores normales ± 7)


(01 – 14 marzo)

Precipitación promedio (mm/día)
últimos 15 días



Fuente: TRMM-3B42-RT, Procesamiento: IGP, Últimos datos: 15MAR2016
Climatología: 2001-2014


Anomalia de precipitación (mm/día)
últimos 15 días



Fuente: TRMM-3B42-RT, Procesamiento: IGP, Últimos datos: 15MAR2016
Climatología: 2001-2014


(14 – 28 febrero)

Precipitación promedio (mm/día)
últimos 15 días



Fuente: TRMM-3B42-RT, Procesamiento: IGP, Últimos datos: 28FEB2016
Climatología: 2001-2014



Anomalia de precipitación (mm/día)
últimos 15 días





Fuente: TRMM-3B42-RT, Procesamiento: IGP, Últimos datos: 28FEB2016
Climatología: 2001-2014

Anomalía de la Temperatura subsuperficial (Febrero, 2S – 2N)


1- 29 Febrero



11 – 15 Marzo




OLR Anomalies 5N-5S



Data updated through 09 MAR 2016


Anomalia de esfuerzo de viento zonal (10^2Nm^{-2})
promediada entre 2S y 2N



Datos ASCAT, Procesamiento:IGP, Ultimo dato:12Mar2016

TAO a lo largo de la línea ecuatorial

Five Day Zonal Wind, SST, and 20°C Isotherm Depth Anomalies 2°S to 2°N Average




Análisis de boyas ARGO a lo largo de la línea ecuatorial

Equatorial (2°S – 2°N) 20°C isotherm depth anomaly (m)


a) Gridded profiles

b) 11-day mean

c) Smoothed 11-day mean



Data: Argo, Processing: IGP, Clim: 1980–2009 (GODAS), Last data: 14MAR2016



Valores del Índice Costero El Niño


Mes	ICEN	Categoría
05/2015	1.36	Cálida Moderada
06/2015	1.96	Cálida Fuerte
07/2015	2.15	Cálida Fuerte
08/2015	2.15	Cálida Fuerte
09/2015	2.07	Cálida Fuerte
10/2015	2.23	Cálida Fuerte
11/2015	2.18	Cálida Fuerte
12/2015	2.07	Cálida Fuerte
01/2016	1.77	Cálida fuerte

Mes	ICENtmp	Categoría
02/2016	1.40 *	Cálida Moderada
03/2016	1.05**	Cálida Moderada

* Se usaron los datos de (Ene. Feb. 2016) ERSST3v, (Mar. 2016) NMME.

** Se usaron los datos de (Feb. 2016) ERSST3v, (Mar. Abr. 2016) NMME

Indice Costero El Nino (ICEN)






TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN EL PACÍFICO SUDORIENTAL


DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA

Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 28 FEB 2016




DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA

Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 10 MAR 2016




DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA

Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 05 MAR 2016



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA

Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 13 MAR 2016






ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN EL PACÍFICO SUDORIENTAL

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA


Anomalia de la Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 28 FEB 2016



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA


DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA

Anomalia de la Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 05 MAR 2016




DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA

Anomalia de la Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 10 MAR 2016



Fuente: AVHRR – NCDC / NCEP-NOAA



Anomalia de la Temperatura Superficial del Mar (C) / Promedio Dia: 13 MAR 2016



Fuente: AVHRR – NCDC / NCEP-NOAA



ANOMALÍAS DEL NIVEL MEDIO DEL MAR EN EL LITORAL PERUANO





Estación	ANMM (cm) 2015												2016		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	13Mar.
Talara	0	-1	5	16	19	15	10	12	16	13	18	19	5	8	4
Paíta	2	0	4	14	20	16	12	13	17	15	19	21	8	10	5
Isla Lobos de Afuera	1	-	-	11	15	14	7	9	11	9	13	15	7	7	1
Chimbote	0	1	4	10	15	15	7	10	12	9	13	15	5	11	1
Callao	-2	-3	0	7	10	12	3	8	9	6	9	9	2	7	-4
San Juan	-1	-2	4	8	10	13	3	8	13	11	11	12	6	9	1
Matarani	-2	-3	3	4	6	9	4	8	12	9	12	12	7	10	4

Promedios Diarios NMM


Estación	Domingo 13 Marzo 2016	
	NMM (m)	ANMM(m)
Talara	0.95	+0.04
Paíta	0.89	+0.06
I. Lobos de Afuera	0.76	+0.01
Chimbote	0.61	-0.02
Callao	0.54	-0.05
Pisco	0.45	-0.05
San Juan	0.40	-0.05
Matarani	0.53	-0.03

Anomalías del nivel medio del mar (0 – 100 Km) al 15.03





Datos: AVISO/ IMARPE

Velocidad y Anomalías del Viento (ASCAT)




Viento Satelital (40 Km frente a la costa del Perú): a) Velocidad del viento (m/s), b) Anomalía de la velocidad del viento (m/s). Fuente: Satélite ASCAT, Procesamiento: Laboratorio de Hidro-Física Marina, IMARPE.

Monitoreo del Viento in situ en el litoral




TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE


Anomalías de la
Temperatura Máxima




Anomalía de la
Temperatura Mínima



Precipitación promedio (mm/día) últimos 15 días




Temperatura superficial del mar (C) Esfuerzo de viento ($N \cdot m^{-2} \cdot 10^{-2}$) promedio de los últimos 15 días




Fuente: TSM(AVHRR-NCDC), clim: 1982-2011
vientos(ASCAT-Ifrermer), clim 2008-2014 corregido con ERA

Anomalia de precipitación (mm/día) últimos 15 días




Fuente: TRMM-3B42-RT, Procesamiento: IGP, Últimos datos: 13MAR2016

Climatología: 2001-2014




Anomalia de temperatura superficial del mar (C) Anomalia del esfuerzo de viento ($N^{\wedge}m-2*10^{\wedge}-2$) promedio de los últimos 15 días




Últimos datos: 12MAR2016


TSM (° C, hasta 330 km)




Temperatura superficial del mar (C) hasta 330Km





Anomalía de TSM (° C, hasta 330 km)



Anomalía de temperatura superficial del mar (C) hasta 330Km



Anomalías de Temperatura Superficial del Mar en el litoral



Estación	ANMM (cm) 2015												2016		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	13Mar.
Talara	0	-1	5	16	19	15	10	12	16	13	18	19	5	8	4
Paita	2	0	4	14	20	16	12	13	17	15	19	21	8	10	5
Isla Lobos de Afuera	1	-	-	11	15	14	7	9	11	9	13	15	7	7	1
Chimbote	0	1	4	10	15	15	7	10	12	9	13	15	5	11	1
Callao	-2	-3	0	7	10	12	3	8	9	6	9	9	2	7	-4
San Juan	-1	-2	4	8	10	13	3	8	13	11	11	12	6	9	1
Matarani	-2	-3	3	4	6	9	4	8	12	9	12	12	7	10	4

Promedios Diarios NMM		
Estación	Domingo 13 Marzo 2016	
	NMM (m)	ANMM(m)
Talara	0.95	+0.04
Paita	0.89	+0.06
I. Lobos de Afuera	0.76	+0.01
Chimbote	0.61	-0.02
Callao	0.54	-0.05
Pisco	0.45	-0.05
San Juan	0.40	-0.05
Matarani	0.53	-0.03

Anomalías de Temperatura Superficial del Mar en el litoral (15.03)





Tabla 1. Promedio diario de la temperatura superficial del mar (°C) y sus anomalías registradas el 15 de marzo de 2016 en la red de estaciones costeras del IMARPE. Las anomalías se han calculado con respecto del promedio climatológico mensual de cada estación.

Estación	T, °C	ΔT °C
Tumbes	28,17	0,27
Paita	22,23	-0,57
San José	24,17	1,77
Chicama	20,93	1,83
Huanchaco	20,30	1,20
Chimbote	23,93	1,63
Huacho	20,13	2,03
Callao	19,10	1,50
Pisco	24,27	1,17
Atico	21,00	--
Matarani	18,47	--
Ilo	17,77	0,77


TSM y ATSM a lo largo del litoral han descendido en 0.6 °C en los últimos días

Paita, Chicama, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo: Promedio TSM = 21.37 °C, Promedio ATSM = +0.98 °C

Anomalías de Temperatura Superficial del Mar en el litoral (15.03)




Temperatura Superficial del Mar Paita (°C)



1997 - 1998 2015 - 2016 C. Mensual

Oficina de Base de Datos


Temperatura Superficial del Mar Chimbote (°C)



1982 - 1983 1997 - 1998 2015 - 2016 C. Mensual

Oficina de Base de Dat


Temperatura Superficial del Mar Callao (°C)



1982 - 1983 1997 - 1998 2015 - 2016 C. Mensual

Oficina de Base de Datos

Temperatura Superficial del Mar Ilo (°C)




1982 - 1983 1997 - 1998 2015 - 2016 C. Mensual


Oficina de Base de Dat

Secciones Paíta y Chicama (T, S, O)

Paíta, 13-14.02.2016




Chicama, 11-12.02.2016




Secciones Paita y Chicama (T, S, O)







Paita, 11-12.03.2016 (BAP Zimi)



Chicama. 11-13.03.2016





Punto Fijo Paíta: T, S, O (14.03.2016)




Salinidad en la superficie del mar-HYCOM (11 de marzo 2016)

Se observa una franja delgada de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) frente a Paita, Chicama y Chimbote. Esto se corrobora con el Punto Fijo de Paita, que muestra AES hasta los 20 m de profundidad.





Punto Fijo Paíta: nutrientes y clorofila-a





La onda Kelvin cálida ocasionó una profundización moderada de la nutriclina (empobrecimiento de los nutrientes en la capa subsuperficial), asociada a una disminución de los valores de clorofila-a en superficie

Punto Fijo Chicama: T, S, O (14.03.2016)



No se evidencian cambios significativos en la estructura vertical en febrero. Presencia de ASS muy cerca de la costa sobre los 80m.




Punto Fijo Callao: T, S, O (14.03.2016)





AVHRR/NOAA, proc.: IMARPE

Máxima profundización de la estructura vertical el 17.02; calentamiento superficial y enfriamiento posterior




Región hidrográfica Pacífico – Ríos Costa Norte






Región hidrográfica Pacífico – Ríos Costa Norte






Región hidrográfica Pacífico – Ríos Costa Centro



Región hidrográfica Pacífico – Ríos Costa Centro




Ríos de vertiente Pacífico – Sur



Resumen del estado de los principales embalses (primera quincena de marzo)

Zona	Nombre del Reservorio	Fecha Reporte	Departamento de Influencia	Área Bajo Riego (ha)	Capacidad Hidráulica (hm³)		Capacidad Hidráulica Almacenada (%)
					Útil	Almacenada	
Costa - Norte	POECHOS	14-mar	Piura	93 240	396,1	239,9	60,6
	SAN LORENZO	12-mar	Piura	42 530	193,0	162,2	84,1
	TINAJONES	14-mar	Lambayeque	87 600	319,0	151,7	47,6
	GALLITO CIEGO	14-mar	La Libertad	55 700	366,0	156,8	42,8
Costa - Centro	VICONGA	13-mar	Lima	24 970	30,0	13,3	44,3
Costa - Sur	CHOCLOCOCHA	09-mar	Ica	23 000	131,1	54,6	41,7
	CONDOROMA	15-mar	Arequipa	20 810	259,0	205,2	79,2
	EL PAÑE	15-mar	Arequipa	27 060	99,6	57,2	57,4
	LOS ESPAÑOLES	15-mar	Arequipa		9,1	7,8	85,8
	PILLONES	15-mar	Arequipa		76,9	60,4	78,5
	EL FRAYLE	15-mar	Arequipa		127,2	111,7	87,8
	AGUADA BLANCA	15-mar	Arequipa		30,4	20,1	66,1
	CHALHUANCA	15-mar	Arequipa		25,2	14,1	55,9
	BAMPUTAÑE	15-mar	Arequipa		40,0	22,6	56,4
	PASTO GRANDE	11-mar	Moquegua	3 500	175,0	88,8	50,8
	PAUCARANI	14-mar	Tacna	1 700	8,5	5,4	63,3
	ARICOTA	15-mar	Tacna	3 200	260,0	198,8	76,5
	JARUMAS	29-feb	Tacna	4 000	12,5	9,8	78,5
Sierra - Centro	CUCHOQUESERA	14-mar	Ayacucho	19 200	60,0	43,8	72,9
Sierra - Sur	LAGUNILLAS	14-mar	Puno	5 000	500,0	424,5	84,9
Situación Nacional		-	-	411 510	3 118,7	2 048,6	65,7




Los reservorios en la costa norte y sur muestran un incremento, alcanzando en promedio 59% y 72% de su capacidad máxima, respectivamente.


Resalta el incremento de la capacidad de embalse de los reservorios debido a las precipitaciones presentadas en la región andina central y sur.

El sistema Rímac viene recuperándose a partir de la quincena de febrero, con un estado hasta el 1 de marzo de 54%.

Series de tiempo de clorofila-a (4 – 14°S, MODIS)





- A) Promedio pentadal de anomalía de *chl-a* (0-100km, 4° S-16° S).
- B) Hovmöller de *chl-a* mensual a lo largo de la costa (0-100km).



Distribución y tallas de anchoveta

1ra quincena de marzo 2016

Pesquería artesanal




Condición reproductiva de anchoveta (1ra quincena de marzo 2016)




Fracción
desovante



Índice de
atresia




Contenido
Graso




Otras especies – 1ra quincena marzo 2016

Pesquería artesanal




Prospección de monitoreo oceanográfico Paíta – Chicama (10 – 17 de febrero 2016)




Perspectivas

Oscilación Madden-Julian y vientos zonales




www.gf-animator.com - UNREGISTERED

Wind 975 Hpa (m/s) – Mean Sea Level Pressure Reduced(Hpa)
ANALISIS: 0000Z 14/MAR/2016 VALIDO: 0000Z 14/MAR/2016




GrADS: IGES/COLA


(a) ASCAT [clim. 2008–2013] (b) TAO [clim. 1993–2014] (c) ARGO [clim. de GODAS] (d) JASON-2 [clim 2002–2014] (e) LOM-IGP [clim. 2008–2013]




Simulación de la propagación de las ondas Kelvin Ecuatoriales




Anomalía de TSM ecuatorial (5° S-5° N)



a) Daily 2°S–2°N 20°C isotherm tilt* (m): 2015 (black), 1997–98 (red), 2002–03 (purple), 2004–05 (green), 2006–07 (yellow), 2009–10 (blue), 2012–13 (magenta)



b) Daily 2°S–2°N 20°C isotherm mean depth (m)




* Zonal depth difference from linear regression fit to longitude (137°E–95°W)

Only for days with at least 10 out of 11 lons. 1–2–1 smoothing. Clim dashed (1993–2012)

Data: TAO/TRITON (last: 12MAR2016). Processing: @KTakahashiG (IGP)


Wind (m/s), convergence (10^{-5} 1/s) and specific humidity (g/kg) at $\sigma=0.995$ (GFS; lon=95°W–85°W)



Probabilidades de El Niño según porcentaje de modelos (IRI) y evaluación experta


Corrida del mes anterior

Early-Feb CPC/IRI Consensus Probabilistic ENSO Forecast



Corrida reciente


Early-Mar CPC/IRI Consensus Probabilistic ENSO Forecast



Según la evaluación experta sobre los resultados de los modelos a inicios de enero, la probabilidad de El Niño en el Pacífico central es de 97% para el mes de abril de 2016 .


Publicado 10 de marzo de 2016

NMME Forecast for Nino 3.4 IC=201603



Preparation: IGP(Peru); Data NMME Project, ERSST4 CLIM81-10,
sponsored by NOAA, DoE, NASA and NSF(USA)


Pronostico con modelos del ICEN CI 201602



Corrida anterior


Pronostico con modelos del ICEN CI 201603

Corrida actual






Nota: Los pronósticos de los modelos CFSv2, CMC1, CMC2, GFDL, NASA, NCAR y GFDL_FLOR tienen como condiciones inicial el mes de marzo de 2016. El modelo ECMWF tiene como condición inicial el mes de febrero de 2016

Pronóstico con modelos del ICEN




Nota: Las líneas delgadas en los pronósticos indican los máximos y mínimos en los "ensembles" de CFS2. Para ECMWF no se cuenta con datos del "ensemble". ECMWF, tiene condiciones iniciales el mes de febrero

Punto Fijo Ilo: T, O (14.03.2016)




Temperatura y anomalía de la temperatura a 100 m (Paíta)



Serie de tiempo de temperatura a 100 m de profundidad y anomalía de temperatura a 100 m de abril de 2014 a marzo de 2016, calculado con la base los datos históricos de MBARI (1994-2010).

NMME Forecast for Nino 3.4 IC=201602



Preparation: IGP(Peru); Data NMME Project, ERSST4 CLIM81-10,
sponsored by NOAA, DoE, NASA and NSF(USA)

Sin actualizar